

Хранене чрез сонда: Едно пакетче **Banatrol Plus** на всеки 6 или 8 часа по време на захранването. Смесва се с 120 мл. вода и се прилага с промивки директно в сондата за хранене. Не смесвайте **Banatrol Plus** с формула за захранване през сонда; разтворът ще се сгъсти и би могъл да запуши захранващата тръба.

- Прилагайте **Banatrol Plus** перорално или чрез сонда за хранене.
- Следете и продължете употребата за 10 дни.

Захранване чрез сонда: Най-често съобщаваното усложнение при захранване с ентерална тръба е диарията. Проявява се при до 30% от пациентите в отделения за общо медицинско и хирургично лечение и при до 68% от пациентите в интензивните отделения. Използват се ректални сонди или торбички, за да се запази целостта на кожата, но те значително увеличават разходите за грижи и могат да причинят декубитална язва на аналния сфинктер. Преоценете и определете необходимостта от коригиране на дозата и подходящата продължителна употреба, въз основа на състоянието на пациента.

• При CDI диария и/или диария, свързана с антибиотици, **Banatrol Plus** трябва да се прилага до прекратяване на антибиотичната терапия. Лекарствени взаимодействия: **Banatrol Plus** не взаимодейства с никакви лекарства и има оптимален ефект при прием от самото начало на диарията.

• Имуно-компроментирани пациенти: **Banatrol Plus** е безопасен за имуно-компроментирани пациенти. Бимуно е изследван в обширни клинични проучвания, които доказват неговата способност да засища единствено добрите бактерии, които на свой ред изтласкат вредните бактерии.

• Алергени: Хора, имащи алергия към латекс (гума) могат да страдат и от алергии към банани, авокадо, маракуя, сливи, ягоди и домати. Това е така наречената плодово-латексова алергия, която се проявява с кихане, кашляне, подсмърчане, сърбези, уртикария също така може да доведе и до анафилактичен шок.

• Лактоза: Бимуно, пребиотикът в **Banatrol Plus** е галактоолигозахарид, който е продукт на ензимна трансформация на лактозата. По време на процеса е възможно малко количество лактоза да остане нетрансформирано.

• Лечение с антибиотици: Честотата на диария, свързана с антибиотици като ампицилин, цефалоспорини, тетрациклини, може да достигне до 26%. Антибиотиците убиват полезните бактерии в червата, които са отговорни за образуването на фекалиите. Много лекарства, включително антиациди, съдържащи магнезий, лекарства, съдържащи сорбитол, класическите лаксативи могат да причинят остра или хронична диария. **Banatrol Plus** не само спира диарията, но спомага за повторното възстановяване на броя на добрите бактерии, унищожени от антибиотиците.

• Инфекция с Clostridium Difficile (CDI или C. diff): CDI е бактерия, която причинява здравословни проблеми, вариращи от диария до животозастрашаващо възпаление на дебелото черво. CDI диарията, дори тежката, не може да се лекува с лекарства против диария, защото те забавят подвижността на червата, което причинява натрупване на токсини и увеличава риска от перфорация на червата. **Banatrol Plus** не забавя подвижността на червата и може да бъде приложен незабавно, докато се изчакват резултатите от фекалния тест за CDI. **Banatrol Plus** абсорбира и улавя C. diff токсина, намалявайки бактериалното натоварване с елиминирането на фекалиите.

Съставки:

Бананови лъспи, Бимуно (транс-галакто-олигозахариди, лактоза, глюкоза, галактоза).
Съдържа мляко. Не съдържа глутен и мазнини.

Важна информация:

Хранителна добавка

Не е единствен източник на хранене

Не е предназначен за лица с галакоземия

Не е предназначен за парентерално хранене

Да не се прилага при деца на възраст под 3 г.

Не повлиява действието на лекарства



Дистрибутор:
„Медихъб Клиникъл Нутришън“ ООД
София 1326, бул. „Ломско шосе“ №218А
Тел.: +359 876 555 278
www.medihub.bg

За информация:
„Медикъл Пойнт“ ООД
София 1220, ул. „Бяла бука“ №1
Тел.: +359 897 06 06 03
e-mail: info@medicalpoint.bg

Banatrol® Plus

При диария и меки или воднисти изпражнения



Banatrol plus е подходящ при:

- Инфекциозни заболявания
- Прием на антибиотици и други медикаменти
- Гастроентерити, ентероколити
- Лъче или химио-терапия
- Ентерално хранене чрез сонда
- Синдром на раздразненото черво
- Стома (оперативен отвор)



Диарията повлиява изцяло начина на живот и обикновено изисква мултидисциплинарен подход, който включва клиничен диетолог, помощ и съдействие от медицинската сестра, лекаря и фармацевта и социално обслужване.

Диарията може да доведе до много последици при пациента:

I. Здравни

Намален апетит
Дехидратация
Кожни раздразнения, рисък от инфекции
Рисък от разпространение на *C. difficile*

II. Социални

Личен дискомфорт и притеснение
Повишен разход за болничен престой
Невъзможност за извършване на ежедневни дейности
Нарушена социализация



Безопасно, достъпно и клинично доказано лечение
при диария

- **Banatrol Plus** значително облекчава симптомите и продължителността на диарията при пациентите.
- **Banatrol Plus** съдържа уникална комбинация от разтворими фибри (пектин) от бананови люспи и транс-галактоолигозахаридиния пребиотик Бимуно.
- Високо разтворимата формула с фибри от бананови люспи, действа чрез абсорбция, за да втвърди воднистите изпражнения и намали времетраенето и степента на сериозност на диарията.
- Разтворимите фибри в банановите люспи имат гелоподобни свойства. Те сгъстяват консистенцията на чревното съдържимо.
- Разтворимите фибри имат пребиотичен ефект, който помага за реабсорбцията на течности в дебелото черво и води до намаляване на воднистата диария. Разтворимите фибри не предизвикват твърди изпражнения и не забавят чревната перисталтика при диария.

Banatrol Plus е средство на избор при първи симптоми на диария или профилактично при прием на медикаменти предизвикващи диария

Banatrol Plus е подходящ при:

- Инфекциозна диария (*C. difficile*),
салмонела
- Диария причинена от медикаменти
- Антибиотична терапия
- Възпалително заболяване на червата
- Синдром на раздразненото черво
- Лъче или химиотерапия
- Ентерално хранене със сонда
- Стома



Хранителна информация: Банан			
Енергийна стойност:			
Калории 40	0%	0g	0%
% от дневните нужди			
Мазнини 0	0%	0g	0%
наситени 0 гр.	0%	0g	0%
ненаситени 0g			
холестерол 0%	0mg	0%	
натрий 1%	45mg	1%	
калий 2%	120mg	4%	
фосфор 0%	9mg	1%	
Общо карбохидрати 4%	10g	3%	
Диетични фибри 8%	2g	8%	
Захари 6g			
Протеини <1g			
Витмин Д 0%	Капсул 0%		
Желязо 0%	Витмин Ц 0%		
Витамин А 0%	Витмин К 0%		
Процентите се отнасят при калориен прием в размер на 2000 Kcal дневно			

Banatrol Plus съчетава силата на две активни съставки:

- Разтворими фибри от бананови люспи
- Транс-галактоолигозахаридиния пребиотик Бимуно

Banatrol Plus е хранителна добавка и не е лекарство. Действието на **Banatrol Plus** започва на втория или третия ден, но в зависимост от тежестта на симптомите и индивидуалните особености на организма може и до седмия ден.

Бананови люспи

Banatrol Plus действа подобно на диетата BRAT (банан, ориз, ябълка, препечен хляб) при лечението на диария. **Banatrol Plus** съчетава диетата BRAT в едно пражче.

Бананите са богати на амилазо-устойчиви разтворими фибри и калий. Чревните бактерии взаимодействват с амилазо-устойчивите фибри, в резултат на което се засилва производството на късо верижни мастни киселини. Наличието на късо верижни мастни киселини в червата, стимулира абсорбцията на вода и електролити от колоноцитите и подпомага за нормализирането на фекалната маса.

Banatrol Plus образува желатино-подобно вещество в червата, като по този начин нормализира водата в изпражненията, сгъстява консистенцията, но не втвърдява прекомерно изпражненията и не забавя перисталтиката.

Пребиотик Бимуно

- **Banatrol Plus** съдържа Бимуно, транс-галактоолигозахариден пребиотик.
- Увеличава броя на полезните бактерии в червата
- Намалява количеството на вредните бактерии в червата
- Подобрява имунната система
- Облекчава симптомите на раздразненото черво
- Подобрява дейността на клетките естествени убийци
- Увеличава противовъзпалителните цитокини
- Пребиотиците не са живи бактерии. Те не се влияят от метаболизма или стомашните киселини и достигат червата непроменени.

Как действа Бимуно?

1. Бимуно достига тънките черва.
2. В тънките черва Бимуно инхибира адхезията на гастро-интестиналните патогенни бактерии.
3. В дебелото черво Бимуно ферментира с помощта на полезните бактерии. Това води до промяна на pH -то на средата и позитивна промяна на микрофлората.
4. Бимуно има селективно действие – действа върху добрите бактерии и засилва имунната система.
5. Повишава се броят на клетките естествени убийци.
6. Увеличава се броят на противовъзпалителните цитокини.

Приложение и дозировка

Banatrol Plus може да бъде приеман перорално и чрез сонда:

Перорално:

Диария: Едно пакетче **Banatrol Plus** три пъти на ден. Дозата определете според нуждите си с минимално едно пакетче на ден и максимално шест пакетчета на ден. Продължете до изчезване на диарията. Меки или воднисти изпражнения: Едно пакетче **Banatrol Plus** един или два пъти на ден. Разтворете в 120 мл. вода или плодови сокове или добавете към влажни храни като ябълков сос, пудинг или кисело мляко.

